トホクのビーツ栽培方法

発芽適温：25℃前後 生育適温：15～25℃
土壌酸度：pH6.0～7.0 連作障害；1～2年あける

1. 作物特性

ビーツはダイコンやカブと同じような種類と思われがちですが、実はホウレンソウと同じアカザ科の野菜です。砂糖の原料となる砂糖大根(シュガービーツ)と区別してテーブルビーツと呼ばれています。冷涼な気候を好む野菜で、春まきと秋まきができます。低温でとう立ちしますので春の極端な早まきは避けましょう。

2. 畑の準備

ビーツは酸性土壌を嫌うので必要に応じて苦土石灰は多めにします。

3. タネまき

ビーツのタネは皮が硬くて吸水しにくいのでタネをガーゼで包み2～3時間水中に漬けておくと発芽しやすくなります。

またビーツは1粒の中に2～3個のタネが入っていますので1粒から2～3本の苗が発芽してきます。タネは1カ所に2～3粒まきますが、それぞれ少しづつ離してまきましょう。

発芽まで10日位かかりますから、その間は土の表面が乾きすぎないように管理します。

4. 栽培管理・収穫

生育に応じて間引きをし、本葉が3～4枚までに一本立ちにします。最後の間引きの時に追肥をして、軽く株元に土寄せをします。

タネをまいてから約70日後、根の直径が5～7cmになった頃が収穫適期です。保存する場合は、葉を切り落として涼しい場所に置くようにします。

5. 利用方法

根の中まで深紅色で独特の風味が味わえるレッド種は、肉質ち密でシチューなど煮込み料理に好適です。イエロー種はやわらかく甘みがあり、おだやかな風味で食べやすいのでサラダなどにも利用します。

《調理例》

サラダビーツと甘酒のスムージー

ゴールデンビーツとグレープフルーツのサラダ

(詳しいレシピはトホクのホームページをご覧ください)

地域/月	栽培例											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地				●	●	●	●	●	●	●	●	●